

Cornouiller à feuilles alternes

Cornus alternifolia



Conseils de plantation



H. : 5 m
L. : 3 m



Zone 3b



Soleil, mi-ombre,
ombre



Sol frais et
bien drainé



Fin mai



Été

Le cornouiller porte des baies bleu-noir en été, saison à laquelle les oisillons vont naître. Il constitue une alimentation importante aussi bien pour les parents que pour les nouveau-nés, qui ont besoin d'être nourris fréquemment.

ANECDOTE

Le nom français du cornouiller vient de « corne » et lui a été donné en raison de la dureté particulière de son bois. Le nom anglais *dogwood* serait lié à une pratique populaire selon laquelle il était souhaitable de laver les chiens avec une décoction de cornouiller pour prévenir les maladies de peau et les parasites.



Troglyte familier • M. Bordeleau



Viréo aux yeux rouges • S. Labbé

Oiseaux visiteurs



Merle d'Amérique • B. Duhamel

Viréo aux yeux rouges
Le viréo est utile puisqu'il se nourrit abondamment d'insectes ravageurs comme les punaises, les sauterelles, les guêpes et différents types de larves. Il mange aussi des baies. Malgré les activités humaines, le viréo aux yeux rouges tolère assez bien les perturbations de son habitat.